

12 zlatých pravidel při automatickém dojení



1. Pravidelně monitorujte zdravotní stav vemene



2. Monitorujte interval dojení



3. Zkontrolujte jednotlivé čtvrtě



4. Zajistěte účinnou přípravu struku



5. Zkontrolujte dojící podtlak



6. Zkontrolujte nasazování při dojení




7. Zabraňte předojení nebo nedododování



8. Zkontrolujte nastavení VMS




9. Zabraňte rozšíření infekce po dojení



10. Udržujte dojící systém v čistotě



11. Mléko okamžitě zchladte



12. Monitorujte výsledky dojení/krmení



Při kontaktu se zvířaty vždy používejte čisté jednorázové rukavice

12 zlatých pravidel při automatickém dojení

— podrobně

1. Pravidelně monitorujte zdravotní stav vemene

- Vždy kontrolujte monitoring krávy v DelPro (hodnocení MDi).
- Pravidelně kontrolujte zdravotní stav mléčné žlázy (použijte hodnoty MDi pro další vyhodnocování pomocí DeLaval CMT, OCC/DCC, HN atd...).
- Pravidelně vyhodnocujte informace o kvalitě mléka z mlékárny.
- Ukládejte záznamy o zdravotním stavu mléčné žlázy každé krávy/čtvrti.
- Mléko podezřelých nemocných krav skladujte vždy odděleně.

2. Monitorujte interval dojení

- Kontrolujte průběh dojení u krav, které nejsou podojeny 2x za 24 hodin.
- Zkontrolujte počet dojení pro různé fáze laktace.
- Je-li to nutné, přizeňte krávy na dojení.
- Podívejte se na krávy označené červeně a informaci konfrontujte s očekávaným nádojem.

3. Zkontrolujte jednotlivé čtvrtě

- Vždy používejte jednorázové rukavice.
- Mléko nikdy neodstříkujte přímo na podlahu.
- Na základě alarmů v monitoringu krav zkontrolujte mléko, nejsou-li v něm sraženiny nebo barevné či jiné změny.
- Před ošetřením vždy změňte nastavení v DelPro pro oddělení mléka.
- Abnormální mléko vždy skladujte odděleně.

4. Zajistěte účinnou přípravu struku

- Nejméně 1 x denně zkontrolujte mytí přípravného strukového násadce.
- Kde je možné, použijte u krav s vysokou vodivostí nebo s vysokým počtem SB schválené přípravky na dezinfekci struků před dojením.
- Mějte na paměti, že příprava struku neznamena pouze jeho očistu, ale také stimulaci k dosažení řádného spuštění mléka.
- Intenzivnější stimulace většinou znamená vyšší tok mléka/minutu.

5. Zkontrolujte dojicí podtlak

- Nejméně jednou denně zkontrolujte dojicí podtlak.
- Hladina podtlaku, rychlost pulzace a poměr pulzace by měly být v souladu s doporučením společnosti DeLaval. *Poznámka: nízký podtlak prodlužuje dobu dojení, prodlužuje působení tlaku na hrot struku a zvyšuje se nebezpečí zhoršení zdravotního stavu mléčné žlázy.*

6. Zkontrolujte nasazování při dojení

- Udržujte kameru čistou.
- Jestliže je vydojení nekompletní, vždy zkontrolujte VMS pozice struků jednotlivých krav.
- Zkontrolujte/upravte dobu přípravy struku, jestliže je tok mléka u jednotlivých krav nízký.
- Zkontrolujte strukové návlečky a krátkou mléčnou hadici, nedochází-li k úniku vzduchu.
- Zkontrolujte pozici ramene.
- Zkontrolujte nastavení čtvrti ve vztahu k náklonu.
- Zkontrolujte umytí uvnitř/vně strukových násadců.

7. Zabraňte předojení nebo nedododojení

- Zkontrolujte limitní hodnotu pro sejmutí oproti vydojení jednotlivých čtvrtí.
- Předojování může poškodit hroty struku.
- Zkontrolujte nastavení pro opětovné nasazení po skopnutí. Pokud je to nutné, požádejte servisního technika o změnu.

8. Zkontrolujte nastavení VMS

- Zkontrolujte pozici žlabu.
- Zkontrolujte funkci čidla zadní desky.
- Zkontrolujte nastavení mytí podlahy.
- Zkontrolujte rychlost dávkování krmiva.
- Zkontrolujte nastavení krmení koncentrátu ve VMS a OPF.

9. Zabraňte rozšíření infekce po dojení

- Vždy použijte schválený dezinfekční přípravek po dojení.
- Jedná se o nejefektivnější způsob, jak zabránit šíření mastitid.
- Krávy odešlete do krmiště, tím po dojení zajistíte, aby chvíli postály a neuléhaly.

10. Udržujte dojicí systém v čistotě

- Každých 8 hodin vyměňte mléčný filtr.
- Každých 8 hodin nechejte proběhnout kompletní cyklus mytí.
- Používejte schválené detergenty, dodržujte dávkování, postup a pokyny o požadované teplotě na etiketě.
- Je-li to požadováno, dezinfikujte dojicí systém. Použijte schválené dezinfekční přípravky, sledujte instrukce na etiketě.
- 1 x denně zkontrolujte v DelPro alarmy mytí.

11. Mléko okamžitě zchladte

- V průběhu dojení a po umytí tanku vždy kontrolujte teplotu, ujistěte se, že je dosaženo řádného zchlazení.
- 1 x denně zkontrolujte v DelPro alarmy chlazení.
- Ujistěte se, že vždy dodržíte příslušná doporučení mlékárny na teplotu mléka.
- Systém chlazení mléka a skladovací tanky na mléko umyjte okamžitě po jejich vyprázdnění, používejte schválené detergenty.

12. Monitorujte výsledky dojení/krmení

- Pravidelně vyhodnocujte seznamy/informace DelPro o kvalitě a složení mléka.
- Jsou-li dostupné, pravidelně je kontrolujte proti údajům z CMT, DCC/OCC, HC atd...
- Pravidelná preventivní údržba včetně výměny strukových návleček, hadic a jiných částí podle doporučení společnosti DeLaval je tím nejlepším způsobem, jak zajistit dobře fungující dojicí systém.
- Postarejte se o dostupnost dostatečného množství objemné píce 24 hodin/7 dní v týdnu pro všechny krávy.
- Minimálně 2 x denně čistěte lehací boxy.
- Je-li to nutné upravte ventilaci stáje.



Při kontaktu se zvířaty vždy používejte čisté jednorázové rukavice