


# Les 10 règles d'or de la désinfection du sabot



1. Désinfecter les sabots de toutes les vaches



2. Utiliser un bac de taille appropriée



3. Trouver le bon emplacement



4. Démarrer avec un bain propre




5. Utiliser des désinfectants homologués



6. Utiliser le dosage approprié



7. Nettoyer les sabots avant la désinfection



8. Changer la solution régulièrement



9. Désinfecter les sabots régulièrement



10. En cas d'absence de bac, pulvériser le produit sur le sabot



Utilisez des gants jetables en vous assurant de leur propreté.

# Les 10 règles d'or de la désinfection du sabot

## – en détail

### 1. Désinfecter les sabots de toutes les vaches

- Sabots avant/arrière
- Toutes les vaches
- Vaches en lactation
- Vaches
- Génisses
- Veaux

### 2. Utiliser un bac de taille appropriée

- Au moins de la taille de l'animal
- Suffisamment profond pour couvrir toute la hauteur des sabots ( $\geq 15\text{cm}$ )

### 3. Trouver le bon emplacement

- Pas d'obstacle pour l'animal
- Bien éclairé
- Orienter la vache de manière à ce qu'elle ne puisse pas éviter le bac
- Nettoyer et sécher la zone de sortie de pédiluve

### 4. Démarrer avec un bain propre

- Nettoyer le pédiluve avant chaque utilisation
- Changer la solution régulièrement et enlever les résidus de fumier

### 5. Utiliser des désinfectants homologués

- N'utiliser que des produits appropriés, testés et prouvés sans dangerosité

### 6. Utiliser le dosage approprié

- Mesurer le volume du pédiluve
- Calculer le dosage préconisé sur les fiches produits
- Eviter le sur- ou sous-dosage

### 7. Nettoyer les sabots avant la désinfection

- Préparer les sabots pour optimiser l'action de la solution de désinfection
- Un pré-lavage du sabot permet d'éviter de souiller le sol et prolonge l'efficacité du soin pédiluve.
- Toujours utiliser le pédiluve avec les produits de désinfection spécifiques appropriés.

### 8. Changer la solution régulièrement

- Faire un changement du bain selon la préconisation de la fiche produit ou de l'état de salissure (environ toutes les 200 vaches)

### 9. Désinfecter les sabots régulièrement

- Désinfecter les sabots au moins une fois par semaine
- Réaliser 3 désinfections par semaine est idéal
- Anticiper l'occurrence de dermatites digitales et ajuster la fréquence des bains en fonction

### 10. En cas d'absence de bac, faire une pulvérisation

- Si l'usage du pédiluve n'est pas possible, vaporiser le produit en spray sur les sabots
- Toujours nettoyer les sabots avant pulvérisation du désinfectant
- Couvrir entièrement la zone du sabot à traiter (talon + espace interdigital)



**Utilisez des gants jetables en vous assurant de leur propreté.**